

СКРИНИНГОВЫЕ МЕТОДЫ

1) M-CHAT (Modified Checklist for Autism in Toddlers – Модифицированный скрининговый тест на аутизм для детей раннего возраста)

- 16-30 месяцев;
- Самостоятельное заполнение родителями/близкими ребенку взрослыми;
- Риск наличия у ребенка с РАС

2) Social Communication Questionnaire (Социально-коммуникативный опросник)

- ⊙ С 4 лет;
- ⊙ Самостоятельное заполнение родителями/близкими ребенку взрослыми;
- ⊙ Скрининг симптомов РАС, риск наличия РАС;
- ⊙ Вопросы относятся к 3 областям:
 - социальное взаимодействие;
 - общение;
 - ограниченные повторяющиеся и стереотипные паттерны поведения.

3) CASD (Опросник расстройств аутистического спектра)

- ⊙ Предназначен для детей и подростков от 1-16 лет;
- ⊙ Для заполнения требуется не более 15 минут;
- ⊙ Отмечается наличие или отсутствие 30 характерных симптомов;
- ⊙ Пункты представляют собой описание симптомов в виде повествовательных предложений (+большое количество примеров);
- ⊙ Симптомы объединены в шесть групп: «Проблемы с социальным взаимодействием», «Навязчивые действия», «Телесно-чувствительные нарушения», «Отклонения в общении и развитии», «Нарушения настроения», «Проблемы со вниманием и осознанием опасности».

4) CARS (Childhood Autism Rating Scale)

Рейтинговая шкала аутизма у детей

- ⊙ Заполняется специалистом на основании наблюдения и информации, полученной от родителей;
- ⊙ 14 сфер, связанных с РАС + общее впечатление;
- ⊙ 7 – балльная шкала;
- ⊙ Общий балл от 30-36,5 – умеренная выраженность РАС; от 37-60 – тяжелая.

Информация взята с официального сайта Федерального ресурсного центра по организации комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра

<http://autism-frc.ru/>